

# 紧急避孕药

## 致服用左炔诺孕酮片 1.5mg “F” 的各位患者

### ■ 关于此药

左炔诺孕酮片 1.5mg “F” 是避孕失败时，或未避孕性交后，进行紧急避孕时使用的避孕药。

### ■ 此药服用方法

请在**性交后 72 小时以内**，一次 1 锭尽早服用。服用的时刻或时段无特别规定，**请尽早服用**。



左炔诺孕酮片是白色锭剂，每片装有 1 锭（一次量）。

符合下列情况者，不能使用此药

- \* 对此药的成份过去有过敏症发生的妇女。
- \* 肝脏有严重障碍者。
- \* 怀孕中的妇女。

符合下列情况者，请径向医师咨询

- \* 肝脏有障碍者。
- \* 心脏有疾患者。
- \* 肾脏有疾患者。

#### 使用注意事项

- 此药并不能完全阻止怀孕。
- 此药是在避孕失败时，或未避孕性交后紧急使用的，并不能用以象通常的口服避孕药那样有计划地避免怀孕。

#### 服用后注意事项

- 如果服用此药后 2 小时以内吐出，请立即联系医师。
  - 服用此药后，也有怀孕的可能性，请做好适当的避孕措施。
  - 服用此药后，可能会有不正常子宫出血或妊娠初期的出血，无法与通常的月经出血区别，请遵照医师指示再次至医院接受诊疗。
  - 此药的成份会转移至乳汁中，授乳中的妇女，服用后 24 小时请避免授乳。
  - 服用此药后，可能会有类似月经出血（消退出血）的现象。
- 此外，还可能出现不正常子宫出血或头痛、恶心、倦怠感、嗜睡等月经时可看到的症状。症状持续时，请径向医师咨询。
- 服用此药后，月经周期或出血的状况（天数或量）会出现一时性的变化。

作为进行有计划的避孕的方法，有在紧急避孕后服用口服避孕药的方法。