

緊急避孕藥

致服用左炔諾孕酮片 1.5mg“F”的各位患者

■ 關於此藥

左炔諾孕酮片 1.5mg“F”是避孕失敗時，或未避孕性交後，進行緊急避孕時使用的避孕藥。

■ 此藥服用方法

請在**性交後 72 小時以內**，一次 1 錠儘早服用。

服用的時刻或時段無特別規定，**請儘早服用**。



左炔諾孕酮片是白色錠劑，每片裝有 1 錠（一次量）。



符合下列情況者，不能使用此藥

- * 對此藥的成份過去有過過敏症發生的婦女。
- * 肝臟有嚴重障礙者。
- * 懷孕中的婦女。

符合下列情況者，請逕向醫師諮詢

- * 肝臟有障礙者。
- * 心臟有疾患者。
- * 腎臟有疾患者。

使用注意事項

- 此藥並不能完全阻止懷孕。
- 此藥是在避孕失敗時，或未避孕性交後緊急使用的，並不能用以像通常的口服避孕藥那樣有計劃地避免懷孕。

服用後注意事項

- 如果服用此藥後 2 小時以內吐出，請立即聯繫醫師。
- 服用此藥後，也有懷孕的可能性，請做好適當的避孕措施。
- 服用此藥後，可能會有不正常子宮出血或妊娠初期的出血，無法與通常的月經出血區別，請遵照醫師指示再次至醫院接受診療。
- 此藥的成份會轉移至乳汁中，授乳中的婦女，服用後 24 小時請避免授乳。
- 服用此藥後，可能會有類似月經出血（消退出血）的現象。
此外，還可能出現不正常子宮出血或頭痛、噁心、倦怠感、嗜睡等月經時可看到的症狀。
症狀持續時，請逕向醫師諮詢。
- 服用此藥後，月經週期或出血的狀況（天數或量）會出現一時性的變化。

作為進行有計劃的避孕的方法，有在緊急避孕後服用口服避孕藥的方法。