

# 응급피임제

## 레보노게스트렐정 1.5 mg 'F'를 복용하시는 환자분

### ■ 본 응급피임제에 대해서

레보노게스트렐정 1.5 mg「F」는 피임에 실패한 경우 또는 피임을 하지 않은 상태에서 성관계를 한 경우에 사용하는 응급피임약입니다.



### ■ 본 응급피임제의 복용법

성관계 후 72 시간 이내에 1회 1정을 최대한 신속히 복용하십시오.

본 응급피임제의 복용시각이나 시간대는 특별히 정해져 있지 않지만 **가급적 빨리 복용**하십시오.



레보노게스트렐정은 백색의 정제로 1 시트에 1 정(1 회분)이 들어있습니다.

#### 다음에 해당하는 분은 본 응급피임제를 사용할 수 없습니다

- \* 본 응급피임제의 성분에 의해 과거 과민증을 일으킨 적이 있는 여성
- \* 심한 간장 장애가 있는 분
- \* 임신 중인 분

#### 다음에 해당하는 분은 의사와 상담하십시오

- \* 간장 장애가 있는 분
- \* 심장질환이 있는 분
- \* 신장질환이 있는 분

#### 사용상 주의사항

- 본 응급피임제는 임신을 완전히 막을 수는 없습니다.
- 본 응급피임제는 피임에 실패한 경우 또는 피임을 하지 않은 상태에서 성관계를 한 경우에 사용하는 것으로 통상의 경구피임약처럼 계획적으로 임신을 회피하지는 않습니다.

#### 복용 후 주의사항

- 본 응급피임제를 복용하고 나서 2 시간 이내에 구토한 경우 즉시 의사에게 연락하십시오.
- 본 응급피임제를 복용한 후에도 임신의 가능성이 있으므로 적절한 피임수단을 취하십시오.
- 본 응급피임제를 복용한 후에는 부정성기출혈이나 임신초기출혈과 통상의 월경을 구별할 수 없는 경우가 있으므로 의사의 지도 아래 재내원하여 진료를 받으십시오.
- 본 응급피임제의 성분은 모유로 이행되므로 모유수유 중인 분은 약 복용 후 24 시간은 수유를 피하십시오.
- 본 응급피임제를 복용한 후에 월경 같은 출혈(소퇴출혈)이 발생할 수 있습니다. 또 부정자궁출혈, 두통, 구역질, 권태감, 졸음 등 월경시에 보여지는 증상이 나타날 수 있습니다. 증상이 계속되는 경우 의사와 상담하십시오.
- 본 응급피임제를 복용한 후에 월경주기나 출혈의 상황(일수와 양)에 일시적인 변화가 나타날 수 있습니다.

응급피임 후의 계획적인 피임방법으로 경구피임약을 복용하는 방법이 있습니다.